Avaliação da Eficiência do uso da água em biomas brasileiros pelo modelo de biosfera IBIS

Emily Ane Dionizio da Silva^a; Suzana Maria Inácio de Carvalho; Celso Von Randow; Jorge Alberto Bustamante Becerra ; Íris Amati Martins

^aInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Rodovia Presidente Dutra, km 40, 12630-000 Cachoeira Paulista- Brasil, Email: { emily.silva; suzana.carvalho;celso.vonrandow; jorge.bustamante; iris.martins } @inpe.br

Resumo

Neste trabalho avaliamos a eficiência do uso da água (EUA) nos biomas Amazônia e Cerrado, utilizando o modelo de superfície IBIS. O IBIS é um modelo de biosfera terrestre que considera as mudanças na composição e estrutura da vegetação em resposta a mudanças ambientais. Testamos as versões pontual (0D) e bidimensional (2D) do modelo na Amazônia, e 2D no Cerrado. Na versão 0D, o modelo foi ajustado com parâmetros de calibração e dados micrometeorológicos para o sítio experimental do programa LBA (*Large-Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia*), K34. Na versão 2D, o modelo simulou uma faixa de grade correspondente à América do Sul, da qual extraímos dados referentes a pontos representativos dos biomas. Com base nos dados observacionais e simulados, calculamos a EUA, assumindo que GPP (*Gross Primary Productivity*) equivale à taxa de difusão de moléculas de CO₂ para o interior da folha, e ET (*Evapotranspiration*), equivale à taxa de difusão de H₂O para fora da folha, e, desta forma $EUA = GPP/ET$. A versão 0D apresentou dificuldade em simular a variabilidade mensal dos fluxos na Amazônia, apresentando um forte estresse hídrico durante a estiagem o que não é observado, influenciando os valores de GPP, ET e NEE (*Net Exchange Ecosystem*). A versão 2D, no entanto, melhora esta representação, onde os picos de produtividade ocorrem durante a estação seca e diminuem na estação chuvosa. No Cerrado, o modelo simulou valores de NPP (*Net Primary Productivity*) com grande variação sazonal, em resposta à variação climática da região, à variação de NEE e GPP. A EUA observada e simulada para a Amazônia apresentou uma tendência em diminuir durante a estação seca, enquanto os valores simulados para o Cerrado, tendência em aumentar. Para trabalhos futuros, recomenda-se analisar em mais detalhe como a representação da umidade do solo influencia a sazonalidade destas variáveis nos dois biomas.

Abstract

We evaluated the WUE (Water Use Efficiency) in Amazonia and Cerrado biomes, using the surface model IBIS. IBIS is a terrestrial biosphere model that simulates dynamic changes in composition and structure of vegetation in response to environmental changes. We tested the site-level (0D) and bidimensional (2D) versions of the model for Amazonia and the 2D version for the Cerrado. In the 0D version, the model was adjusted with calibrated parameters and climatological conditions for Manaus, AM, using observations from a micrometeorological tower of the LBA program. In the 2D version, the model simulated a domain covering South America, where we extracted representative grid points of the biomes. Based on the observed and simulated data, we calculated the ecosystem WUE, assuming that GPP corresponds to the rate of diffusion of CO₂ molecules into the leaves, and the ET corresponds to the rate of diffusion of H₂O molecules outside of the leaves, and therefore $WUE = GPP / ET$. In the 0D version the model had presented difficulty in simulating the monthly variability of fluxes in Amazonia, showing a strong drought stress during the dry season that is not observed. This influences the simulations of GPP, ET and NEE. In the 2D version there is improvement in this representation, where productivity is not reduced during

55 the dry season, as usually observed in the rain forests. For the Cerrado, the 2D model
56 simulated NPP with large seasonal variations in response to the climatic variability and
57 variations in NEE and GPP. The observed and simulated WUE in Amazonia trended to
58 diminish during the dry season, while simulated values in the Cerrado trended to increase.
59 For future studies, we recommend to analyze in more detail how the representation of soil
60 moisture and water stress is influencing the seasonal variability of these variables in both
61 biomes.

62
63

64 **1. Introdução**

65 Os ecossistemas tropicais exercem um importante papel na regulação ciclo de carbono e
66 água, influenciando o clima regional e global. A Amazônia, floresta tropical úmida, é grande
67 fornecedora de vapor de água (calor latente) para a atmosfera, e ao mesmo tempo,
68 importante 'seqüestradora do excesso' de gás carbônico atmosférico (AGUIAR *et al.*, 2006).

69 O Cerrado, caracterizado por um mosaico de fitofisionomias que vai desde formações
70 florestais à formações savânicas e campestres, também desempenha papel fundamental no
71 processo de distribuição dos recursos hídricos, já que é o local de origem das grandes
72 bacias hidrográficas brasileiras e do continente sul americano (LIMA & SILVA, 2008).

73 A disponibilidade de dados climáticos em diferentes escalas de tempo é fundamental para
74 se discutir a origem e a manutenção de um ecossistema, para compreender aspectos de
75 sua dinâmica e também para prever os efeitos de perturbações ou práticas de manejo com o
76 auxílio de modelagem numérica, em especial dos modelos acoplados superfície-atmosfera.

77 Modelos de biosfera terrestre são os componentes dos modelos climáticos que simulam a
78 interação entre a superfície dos continentes e a atmosfera. Após quatro décadas de
79 evolução, esses modelos passaram por transformações significativas, caracterizadas por
80 diversas gerações (SELLERS *et al.*, 1997). Atualmente, os modelos incorporam uma série
81 de processos do sistema terrestre relacionados à superfície continental como, por exemplo,
82 processos biogeofísicos de maneira geral (fluxos de superfície, turbulência, etc.), fenologia e
83 dinâmica de vegetação, ciclo do carbono terrestre, outros ciclos biogeoquímicos, hidrologia
84 superficial, e emissões de gases-traço, VOCs, poeiras e aerossóis (OLESON *et al.*, 2008).

85 O objetivo geral deste trabalho é avaliar a eficiência na qual os dois maiores biomas
86 brasileiros, Amazônia e Cerrado, utilizam a água, através de medidas de torres de fluxos e
87 simulações com o modelo de biosfera terrestre IBIS (KUCHARIK *et al.*, 2000), contribuindo
88 com informações sobre a variabilidade sazonal dos fluxos de evapotranspiração e
89 produtividade primária bruta, melhorando a compreensão de como a vegetação tropical
90 utiliza e dimensiona as trocas carbono e água no sistema solo-planta-atmosfera.

91
92

93 **2. Material e métodos**

94 **2.1 Áreas de estudo**

95 As áreas em estudo compreendem áreas dos biomas brasileiros Amazônia e Cerrado,
96 sendo que para a Amazônia, foi utilizado o sítio experimental do programa LBA (*The Large
97 Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia*) K34, que está localizado na Reserva
98 Florestal de Cuieiras, no município de Manaus – AM (02°36'S, 60°12'W). Para o Cerrado,
99 selecionamos uma área localizada à 09.25°S e 46.25W.

Figura 1. Localização das áreas de estudo

100
101
102
103

2.3 Descrição do modelo IBIS

104 O IBIS simula os processos da superfície terrestre (trocas de energia, água e *momentum*
105 entre o solo, a vegetação e a atmosfera), fisiologia do dossel (fotossíntese e condutância do
106 dossel), fenologia da vegetação (produção de folhas e senescência), vegetação dinâmica
107 (distribuição, reciclagem e competição entre os tipos de vegetação) e balanço de carbono
108 terrestre (produção primária líquida, reciclagem do tecido vegetal, carbono no solo e
109 decomposição da matéria orgânica) (KUCHARIK *et al.*, 2000).

110 O modelo segue uma hierarquia conceitual e inclui submodelos (ou módulos) organizados
111 de acordo com a escala temporal: processos de superfície (transferência de energia, água,
112 carbono e momentum), biogeoquímica do solo (ciclo do nitrogênio e do carbono), dinâmica
113 da vegetação (competição das plantas por luz, água e nutrientes), fenologia (baseada no
114 desenvolvimento medido por graus-dia) (COSTA, 2009).

115 Foram realizadas rodadas considerando num primeiro momento a vegetação estática (em
116 que a fenologia da vegetação é prescrita e fixa, sem responder a mudanças nas condições
117 ambientais), e posteriormente considerando a vegetação dinâmica (em que as
118 características fenológicas da vegetação como o índice de área foliar são determinadas
119 dinamicamente em resposta às forçantes ambientais). O modelo simulou o balanço de
120 carbono e a evapotranspiração por um período de oito anos, dos quais alguns são ilustrados
121 neste trabalho.

122 Na versão 2D, o modelo foi programado para simular o balanço de carbono e a
123 evapotranspiração para um domínio de grade cobrindo a América do sul por um período de
124 cinquenta anos. Os cinco últimos anos desta simulação foram utilizados para formar um ano
125 médio, o qual foi utilizado nas análises para os dois ecossistemas em estudo. Para o bioma
126 amazônico, foram extraídos, os valores de GPP, ET, Reco e NEE, para as coordenadas 02
127 S, 60 W, e para o cerrado, 09.25°S, 46.25W.

128
129
130

2.4 O cálculo da EUA

131 Para calcular a eficiência no uso da água, partiu-se do princípio de que a taxa de
132 assimilação (GPP) equivale taxa de difusão de moléculas de CO₂ para o interior da folha, e
133 a taxa de transpiração (ET), equivale taxa de difusão de H₂O para fora da folha. Onde a
134 taxa de assimilação e transpiração, são fornecidas pelo particionamento da NEE e dados de

135 fluxo de calor latente, respectivamente, através dos dados de torre fluxo, do sítio
 136 experimental K34. A EUA pode então ser expressa pela seguinte equação,
 137 $EUA = GPP/ET$ (1)
 138 onde GPP é a produção primária bruta, em gC/m², e ET é a evapotranspiração em mm.
 139
 140

141 3. Resultados e discussão

142 3.1 Modelo IBIS versão 0D

143 O modelo foi executado em dois modos: modo de vegetação estática, em que a fenologia da
 144 vegetação é mantida fixa, sem ser influenciada pelas condições ambientais, e o modo de
 145 vegetação dinâmica, em que o índice de área foliar, altura dos tipos funcionais de plantas e
 146 outras características fenológicas vegetação são calculadas diariamente pelo modelo.

147
 148 Figura 2. Observações e simulações do modelo IBIS de a) troca líquida do ecossistema
 149 (NEE), b) produção primária bruta (GPP), c) evapotranspiração (ET), d) respiração do
 150 ecossistema (Reco), para o sítio experimental K34. A estação seca em cada figura é
 151 representada pelas áreas sombreadas em amarelo.
 152

153 Os resultados mensais simulados divergem dos dados observados, constatando uma
 154 dificuldade do modelo em representar os possíveis efeitos de estresse hídrico na floresta
 155 durante a estação seca (Figura 2). Essa dificuldade em simular a estação seca de forma
 156 adequada, interferiu nos resultados de GPP e NEE. Como o estresse hídrico simulado foi
 157 maior do que o valor real, a GPP simulada foi menor do que os valores reais na estação
 158 seca e a NEE se mostrou maior em estações chuvosas, o que contraria os dados
 159 observados.

160 Uma hipótese seria que no modelo, as camadas de solo representadas, totalizam cerca de 8
 161 m de profundidade apenas, o que para a região é considerado uma parcela pequena da
 162 área de absorção das raízes. Por este motivo, o modelo poderia ter gerado um estresse
 163 hídrico muito maior do que o estresse hídrico observado.

164 Porém, essa representação acentuada do estresse hídrico na região revela características
 165 importantes no modelo. Apesar de superestimada, a capacidade de representar as
 166 restrições na absorção de água pelas plantas é importante, induzindo um *feedback*
 167 fisiológico (no caso, uma resposta da condutância estomática) sobre os processos foliares
 168 (diminuição da GPP) e perdas por evaporação (diminuição da ET). Outra característica
 169 notável é a sensibilidade do modelo em representar a estação seca, assim que se inicia a

170 estação o modelo responde rapidamente, caindo de forma bruta os valores de GPP e
 171 aumentando os de NEE.

172 Na análise dos totais anuais, constatamos que o modelo, em suas atuais parametrizações,
 173 representa os valores das trocas de carbono e água, relativamente satisfatórios em termos
 174 de similaridade com os valores totais anuais observados, exceto em relação aos valores de
 175 NEE, considerando a vegetação estática.

176 A representação temporal da EUA, ilustrada na Figura 3, revela que durante a estação seca
 177 há uma tendência em diminuir a eficiência no uso da água, e que o modelo IBIS, apesar de
 178 subestimar os valores, captura esta variação. O resultado obtido é interessante, pois
 179 demonstra que o modelo captura a variação dos dados observados, embora demonstre ser
 180 mais sensível e apresentar um ligeiro atraso em relação às observações. Outro fator
 181 importante, é que o cálculo da EUA simulada, baseia-se em dados de GPP e ET
 182 anteriormente descritos neste relatório, o que pode ter comprometido os valores de EUA,
 183 devido à má representação da GPP na estação seca. Observa-se que em condições de
 184 menor evapotranspiração e maior assimilação, encontramos uma maior eficiência do uso da
 185 água (período de chuvas), e em condições opostas, com menor taxa de assimilação, e
 186 aumento da evapotranspiração, encontramos uma menor eficiência.

187
 188 Figura 3. Representação temporal da eficiência do uso da água observada e simulada pelo
 189 modelo IBIS em modo de vegetação estática e dinâmica. As colunas em amarelo
 190 representam à estação seca dos anos correspondentes.

191
 192
 193

3.2 Modelo IBIS versão 2D na Amazônia

194 Os resultados mensais simulados apresentados na Figura 4 revelam que o modelo IBIS 2D
 195 constatou um sumidouro de dióxido de carbono para a região amazônica durante o ano
 196 analisado, apresentando uma leve diminuição de absorção de CO₂ no início do período de
 197 seco em julho. Observamos também um aumento na ET, GPP e Reco para este período.
 198 Esses aumentos relacionados à produtividade e ET são mais coerentes com o que foi
 199 observado no sítio de floresta (Figura 2), porém como estas simulações são representativas
 200 de um ponto de grade do modelo 2D que representa uma escala espacial muito maior do
 201 que a escala local da torre de fluxos, uma comparação direta entre as simulações e os
 202 dados observados na torre não é adequada. É interessante observar, no entanto, que o
 203 modelo 2D aparentemente não apresenta forte estresse hídrico no período de estiagem,
 204 mantendo a atividade fotossintética intensa durante este período. O mesmo ocorre com a
 205 respiração do ecossistema, que na Figura 4, aparece como maior durante o período de
 206 secas. Embora não possamos validar a representação do modelo frente a dados
 207 observacionais, podemos afirmar que numa escala temporal ele representa adequadamente
 208 a variação temporal do clima e das trocas de carbono.

209

210

211 Figura 4. Totais mensais simulados pelo modelo IBIS- 2D na Amazônia de: a) troca líquida
 212 do ecossistema (NEE), b) evapotranspiração (ET), c) produção primária bruta (GPP), d)
 213 respiração do ecossistema (Reco), para o sítio experimental K34.

214

215

216

3.3 Modelo IBIS versão 2D no Cerrado

217

218

219

220

221

222

O Cerrado é um bioma com sazonalidade marcante, tendo um período longo de estiagem, que geralmente tem início na segunda quinzena de março, e termina no mês de setembro. A representação do modelo indica que esta estiagem causa forte impacto no ciclo de carbono e água, principalmente no período de junho a novembro. Esses valores podem ser observados na Figura 5a onde o mês de junho revela uma diminuição drástica na captação de CO₂, e o ecossistema torna-se uma fonte para a atmosfera.

223

224 Figura 5. Totais mensais simulados pelo modelo IBIS- 2D no Cerrado ; a) troca líquida do
 225 ecossistema (NEE), b) produção primária bruta (GPP), c) evapotranspiração (ET), d)
 226 produção primária líquida (NPP), para o sítio experimental K34.

227

228

229

Nas Figuras 5 c-b-d, observamos que os valores de GPP, ET e NPP também são marcados pelos meses de junho e novembro, delimitando o período de estiagem representado pelo modelo.

230 Observamos que o modelo consegue representar os contrastes sazonais de produtividade
 231 no cerrado, que é caracterizado pela grande diminuição da fitomassa foliar e transpiração,
 232 devido à diminuição da atividade fotossintética em resposta a diminuição da disponibilidade
 233 de recursos hídricos. Este resultado revela uma resposta funcional dos tipos de vegetação
 234 do Cerrado em IBIS (estratos de árvores caducifólias e de herbáceas), sensíveis e
 235 compatíveis às variações climáticas do ambiente.
 236
 237

3.4 A EUA pelo modelo IBIS-2D

239 A Figura 6, apresenta os valores de EUA para os biomas Amazônico e Cerrado calculados a
 240 partir dos valores obtidos pelo modelo IBIS- 2D.

241

242 Figura 6. Valores mensais da eficiência no uso da água simulados pelo modelo de biosfera
 243 IBIS-2D nos biomas Amazônia (a) e Cerrado (b).
 244

245 O cálculo da eficiência do uso da água baseado nos dados modelados para os biomas,
 246 Amazônia e Cerrado, revelam que o início de seus períodos de estiagem são caracterizados
 247 por valores opostos de EUA. Nas simulações realizadas para a Amazônia, Figura 6a,
 248 notamos uma tendência da EUA diminuir nos meses de junho a agosto, enquanto para o
 249 Cerrado esses valores aumentam acentuadamente. Essa resposta está diretamente
 250 relacionada aos valores de GPP e ET simulados para ambos os biomas. Para o Cerrado
 251 temos uma queda nos valores de GPP e ET no início do mês de junho enquanto para a
 252 Amazônia, um aumento.

253

254 Figura 7. Relações encontradas entre a Evapotranspiração e a Produtividade encontradas
 255 nas simulações do modelo IBIS-2D para os dois biomas em estudo.
 256

257 As relações empíricas encontradas a partir dos dados simulados de GPP e ET, pela versão
 258 2D do modelo, revelam que existe uma maior relação entre essas variáveis para o bioma
 259 Cerrado (Figura 7-b). No entanto, nada se pode afirmar sobre o resultado encontrado, pois
 260 não temos dados observados disponíveis para inferir sobre a verdadeira EUA neste bioma.

261 Em contrapartida, na literatura existem evidências de que as gramíneas conseguem ser bem
 262 mais eficientes quanto ao uso da água, do que as árvores tropicais. Isto acontece devido à
 263 suas características fisiológicas, as quais permitem que elas se desenvolvam a altas
 264 intensidades luminosas e em altas temperaturas. Essas plantas também possuem maior
 265 eficiência em captar e armazenar o carbono oriundo do CO₂, através da via de carboxilação
 266 C₄, permitindo gerenciar melhor a abertura estomática (BUCKERIDGE, 2008).
 267
 268

269 **4. Conclusões**

270 A representação da EUA através do cálculo $EUA = GPP/ET$ revelou uma diminuição da
 271 eficiência nos períodos de estiagem, resultado que não era esperado, devido a diversos
 272 mecanismos fisiológicos encontrados pelas plantas para controlar a perda de água nestas
 273 fases do ano.

274 As simulações do modelo IBIS, realizadas em suas versões pontual (0D) e bidimensional
 275 (2D), mostraram que, em geral, o modelo apresentou um médio desempenho, devido a
 276 dificuldades na representação do estresse hídrico para a versão pontual e a “amenização”
 277 deste fenômeno na versão bidimensional. Em trabalhos futuros, recomenda-se analisar em
 278 mais detalhes a estrutura do código do modelo com relação ao módulo de biogeoquímica do
 279 solo, onde estão inseridos os parâmetros responsáveis pela umidade, para uma melhor
 280 representação dos efeitos de estresse hídrico nas componentes do balanço de carbono.

281 Resultados das simulações do modelo IBIS 2D para a Amazônia e o Cerrado revelam que o
 282 modelo consegue simular as trocas de carbono para cada um dos biomas, representando
 283 suas características intrínsecas quanto à GPP, NEE e ET, que durante o período de
 284 estiagem fornecem respostas características da vegetação quanto a liberação, captação de
 285 CO₂ e perda de água. No caso do Cerrado, o modelo representa caracteristicamente a
 286 acentuada diminuição de produtividade e evapotranspiração, encontradas no bioma.

287 Neste sentido, podemos afirmar que o modelo IBIS possui grande potencial na
 288 representação das interações entre a biosfera e atmosfera. Assim, pretende-se dar
 289 continuidade ao trabalho de “Avaliação da eficiência no uso da água em diferentes biomas
 290 brasileiros”, utilizando o modelo IBIS, com o intuito de analisar e buscar as possíveis
 291 deficiências no código do modelo quanto à representação de umidade no solo, que possam
 292 melhorar os efeitos da sazonalidade climática nas trocas de água e carbono.
 293
 294

295 **Referências bibliográficas**

- 296 Aguiar, R. G *et al.* Fluxos de massa e energia em uma floresta tropical no sudoeste da
 297 Amazônia. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.21, n.3b, p.248-257, 2006.
- 298 Buckeridge, M.S. *et al.* Respostas de plantas às mudanças climáticas globais. In: *Biologia e*
 299 *Mudanças Climáticas no Brasil. Biologia e Mudanças Climáticas no Brasil.*
 300 Organizado por marcos Silveira Buckeridge - São Carlos: Rima Editora, 2008. 316p.
- 301 Costa, M.H., *et al.* Estado-da-arte da simulação da taxa de fixação de carbono de
 302 ecossistemas tropicais. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.24, n.2, 179-187, 2009.
- 303 Kucharik, C. J., *et al.* Testing the Performance of a Dynamic Global Ecosystem Model: Water
 304 Balance, Carbon Balance, and Vegetation Structure, *Global Biogeochemical Cycles*,
 305 14 (3), 795–825, 2000.
- 306 Lima & Silva, 2008. Recursos hídricos do bioma Cerrado – Importância e situação. In:
 307 *Cerrado : Ecologia e Flora*, Sano, S.M; Almeida, S.P. de; Ribeiro, J.F., Embrapa
 308 Cerrados- Brasília, DF. Embrapa Informação Tecnológica, 2008. v.1. 407p.
- 309 Oleson, K. W., *et al.* Improvements to the Community Land Model and their impact on the
 310 hydrological cycle, *J. Geophys. Res.*, 113, G01021, 2008.
- 311 Sellers, P. J.; *et al.* Modeling the exchanges of energy, water, and carbon between
 312 continents and the atmosphere. *Science*, v. 275, n. 24, p. 502- 509, 1997.